

עלון מידע לתכשיר טבליות דקסמתילפנידאט 5 ו-10 מג Dexmethylphenidate על פי נוהל 129 אגף הרוקחות, משרד הבריאות

- **שם התכשיר :**
דקסמתילפנידט 5 מג טבליות (שם התכשיר המקורי: פוקלין)
דקסמתילפנידט 10 מג טבליות (שם התכשיר המקורי: פוקלין)
- **שם החומר הפעיל:**
דקסמתילפנידט **Dexmethylphenidate**
- **חוזק וצורת מתן:**
טבליות 5 או 10 מ"ג
- **התוויה:**
דקסמתילפנידט מיועד לטיפול בהפרעת קשב וריכוז ADHD.
- **הנחיות שימוש:**
 - קח דקסמתילפנידאט בדיוק כפי שהורה הרופא. יתכן והרופא יתאים וישנה את המינון עד להגעה למינון המתאים.
 - קח פעמיים ביום בהפרש של לפחות 4 שעות.
 - אפשר לקחת עם או בלי אוכל.
 - יתכן והרופא יבצע בדיקות דם, לב ולחץ דם, במשך הטיפול. יש לעקוב אחרי גובה ומשקל ילדים מטופלים. יתכן והטיפול יופסק אם יתגלו בעיות בבדיקות.
 - אם אתה או ילדך נטלתם מינון מופרז של התרופה, התקשר לרופא או למרכז רפואי או לשירותי חירום לקבלת טיפול מיידי.
- **אזהרות:**
 - לפני התחלת הטיפול ספר לרופא על כל בעיה רפואית של המטופל או משפחתו, במיוחד אם:
 - ישנה בעיית לב מכל סוג, או לחץ דם.
 - בעיות נפשיות כגון פסיכוזות, מניה, הפרעה דו קוטבית או דיכאון.
 - כיפיון, התקפי התכווצויות, או בדיקות EEG עם ממצאים חריגים.
 - בעיות בזרימת דם באצבעות ידיים או רגליים.
 - בשימוש בדקסמתילפנידאט וסטימולנטים אחרים דווחו מקרים של:
 - מוות פתאומי שמטופלים להם היתה בעיית לב קודמת.
 - שבץ והתקף לב במבוגרים.
 - עליה בלחץ דם ובקצב לב.

• התוויות נגד ותופעות לוואי ידועות

- אין לקחת דקסמתילפנידט אם ילדך מאד חרד, מתוח, או נסער
- אין לקחת דקסמתילפנידט אם המטופל סובל מגלאוקומה (יתר לחץ תוך עיני), יש לו טיקים, או סינדרום טורט.
- אין לקחת דקסמתילפנידט אם המטופל לקח ב 14 יום האחרונים תרופה נגד דיכאון ממשפחת מדכאי מונו אמיין אוקסידאז - MAOI.
- אין לקחת דקסמתילפנידט אם המטופל אלרגי למרכיבי התרופה. ראה רשימת מרכיבים בהמשך.
- תופעות לוואי חמורות אפשריות:
 - תגובה אלרגית חריפה: קשיי נשימה, קושי בבליעה, פריחה, חום.
 - עיכוב גדילה לגובה ועיכוב עליה במשקל בילדים.
 - התקפים אפילפטיים במיוחד עם ילדים עם היסטוריה של התקפים.
 - שינויים בראיה, טשטוש ראיה.
 - זיקפה ממושכת וכואבת: פריאפיזם. במקרה זה יש לפנות לעזרה רפואית מידית למניעת נזק ממושך.
- תופעות לוואי שכיחות:
 - כאבי בטן.
 - בחילות.
 - הפחתת תיאבון.
 - חום.
 - זו איננה רשימה מלאה של תופעות הלוואי. שאל את הרופא או הרוקח בכל מקרה בו אתה חש בתופעת לוואי שאיננה חולפת.

• תנאי אכסון

שמור את הטבליות במקום בטוח הרחק מהישג יד של ילדים. יש לשמור את התרופה בטמפרטורה בין 15-30 מעלות.

• מרכיבים לא פעילים:

עמילן, לקטוז מונוהידראט, צלולוז, מגנזיום סטיראט, צבע מאכל D&C Yellow Lake#10 ב 5 מ"ג בטבליות 10 מג אין צבע.

• שם היבואן:

דראגסטור. נט בע"מ, צבי ברגמן 10, סגולה פתח תקוה. import@shor.co.il

[למידע מלא באנגלית לחץ כאן](#)